



예방접종 주의사항 안내문

안전한 예방접종이 될 수 있도록, 예방접종 전·후 주의사항에 따라주세요.

- 예방접종 전, 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 심각한 급성 이상반응(아나필락시스 등) 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- 접종 부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 당일 음주나 지나친 운동은 자제하고, 반나절 이상 안정을 취합니다.

예방접종 후 발생할 수 있는 이상반응을 안내 드립니다.

- 국소 이상반응 : 접종 부위가 빨갛게 부어오름, 붓기, 통증 등
- 전신 이상반응 : 발열, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 발생하면 이렇게 대처해주세요.

- 예방접종 후 발생할 수 있는 이상반응은 대부분 경미한 이상반응이며 일반적으로 수일 이내 호전되므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우 또는 평소와 다른 심한 이상반응이 나타나는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

- ▶ 예방접종 후 이상반응이 발생하면 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 주소지 관할 보건소를 통해 신고하실 수 있습니다.
- ▶ 예방접종으로 인한 이상반응 발생시, 예방접종과의 인과성이 인정되는 경우 보상을 하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으며, 자세한 사항은 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.