

위기경보 '주의단계' 발령
원숭이두창 바로 알기 ?!

Q1 원숭이두창은 사람에게 어떻게 전파되나요?

- 원숭이 두창은 인수공통감염병으로
  동물 → 사람, 사람 → 사람, 감염된 환경 → 사람으로 전파됩니다.
- **피부상처 또는 점막을 통한 감염원과의 직접 접촉**으로 감염
- 감염환자의 **체액, 병변**이 묻은 매개체(의복 등) 접촉
- 코, 구강, 인두, 점막, 폐포에 있는 **비말 접촉**에 의한 전파
- 바이러스가 포함된 에어로졸을 통한 **공기전파는 가능하나 흔하지 않습니다.**






Q2 원숭이두창의 주요 증상은 무엇입니까?



- **발열**, 두통, 근육통, 요통, 오한, 허약감 등을 시작으로
  1-3일 후에 얼굴 중심으로 발진이 확산됩니다.



- 원심형 발진은 얼굴, 손바닥, 발바닥 등 **신체 다른 부위로 확산**
- **구진성 발진**은 반점 → 구진 → 수포 → 농포 → 가피의 단계
- **동일한 신체부위 내 발진**은 주로 **같은 진행 단계**
- 감염 후 **5~21일(평균 6~13일)이내**에 나타나며 **2~4주간 지속**됩니다.

Q3 원숭이두창 감염을 예방하려면 어떻게 하나요?

- 예방목적으로 상용화된 백신은 없으나, 대부분 **대증치료로 자연 회복**됩니다.
- **원숭이두창 발생지역 방문을 자제**하고,
  부득이하게 방문할 경우 **개인보호구(장갑, 마스크)를 사용**하세요
- **개인위생수칙(손 씻기, 손 소독제 이용하기)을 준수**해 주세요.
- **야생동물과의 접촉을 자제**하고, **야생고기 취급 및 섭취에 주의**해주세요.



Q4 원숭이두창 의심증상 발생 시 어떻게 해야 하나요?



발생지역에서 귀국 후 21일 이내 발진, 발열 등 의심 증상 발생 시,
의료기관 방문 전 **질병관리청 콜센터(☎1339)**로 먼저 문의해주세요.

Q5 원숭이두창과 다른 피부질환과의 차이점은 무엇인가요? (제공) 대한감염학회

구분	원숭이두창 (Monkeypox)	수두 (Varicella)	대상포진 (Herpes zoster)	단순포진 (Herpes simplex)	홍역 (Measles)
발진 사진	  * 미국 CDC	 	 	 	 
발진 특징	• 머리부터 시작해서 전신 팔다리 쪽으로 진행 • 경계가 명확하고 중앙이 파인 수포성 발진 • 대부분 같은 단계의 발진 • 손·발바닥 침범	• 머리를 포함하여 주로 몸통 쪽으로 진행 • 경계가 불명확한 수포성 발진 • 발진마다 단계가 다를 수 있음 • 손·발바닥 침범 드묾	• 몸 전체에 나타날 수 있으며, 신경절을 따라 띠 형태로 나타남 • 국소적인 부위에 나타나는 수포성 병변	• 국소적으로 피부,점막(눈, 입술 등)모두 침범 가능 • 주로 입술, 구강, 인두, 음부 쪽 발생 • 수포, 궤양 동반 가능	• 붉은 반구진성 발진 • 얼굴에서 귀뒤, 이후 몸통 중앙 쪽으로 진행 • 탈피 가능
임상양상	• 발열+두통+근육통부터 시작 • 고열 가능 • 발열 1~4일 이후에 발진이 발생	• 두통+근육통부터 시작 • 보통은 미열 (38.8도 미만) • 발열 0~2일 이후에 발진이 발생	• 통증이 먼저 나타날 수 있음 (감각신경 침범) • 운동신경 침범의 경우 마비 동반 가능	• 병변 부위 통증, 가려움증 유발	• 발열+기침+결막염 • 이런 전구증상 수일 발생 후 발진 발생
림프절병증	• 목, 겨드랑이, 서혜부 • 단단한 압통	• 드묾	• 드묾	• 드묾	• 드묾
여행력, 성접촉력	• 아프리카(콩고) • 유럽(영국, 스페인, 포르투갈 등) • 남성 동성애자 중심으로 발생 중				• 중국, 인도, 아프리카

원숭이두창의 조기 발견과

지역사회 확산 차단을 위해

구로구민의 협조가 필요합니다.